

PRONTUARIO DE LA NATURALEZA ALBACETENSE

Recopilado por Arturo VALDÉS FRANZI^{1,2}

José GÓMEZ NAVARRO^{1,2}

Domingo BLANCO SIDERA²

y Juan PICAZO TALAVERA²

El Prontuario de la Naturaleza Albacetense pretende recoger aquellos conocimientos inéditos, o publicados en otros medios, sobre la Naturaleza de Albacete que, por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones de la revista SABUCO. Los criterios de selección son difíciles de unificar para todos los grupos taxonómicos, en general hemos utilizado los siguientes: primeras citas de especies para la provincia, especies escasas en el ámbito provincial, especies incluidas en catálogos de especies amenazadas en la normativa vigente o en las diferentes listas rojas publicadas, ampliación de áreas de distribución, número relevante de individuos, observaciones fenológicas inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución conocida, datos relevantes sobre la ecología o comportamiento de las especies. En el caso de las aves amenazadas y por razones de espacio, sólo se consideran las especies “En Peligro Crítico” y “En Peligro” de la Lista Roja, y “En Peligro” de la normativa nacional y autonómica de Castilla-La Mancha. En todos los casos, y especialmente para especies catalogadas “En Peligro de Extinción”, se omitirán detalles que pudieran suponer riesgo para sus poblaciones. Las citas que necesiten homologación por los correspondientes comités biológicos de ámbito nacional serán reseñadas con un asterisco (*). Para la taxonomía y sistemática de las aves, se ha considerado la *Lista Mundial de Aves del COI* <https://www.worldbirdnames.org/new/>. En taxonomía de hongos se ha seguido a *Index fungorum*.

Sin perjuicio de la selección realizada y aceptación de citas, éstas han sido remitidas voluntariamente por sus autores, o recogidas de distintas plataformas de internet, y a ellos (indicados negrita) corresponde la veracidad de los datos reflejados. Se recogen también citas que forman parte de artículos en otras publicaciones científicas y ejemplares depositados en colecciones, indicando las referencias bibliográficas o números de registro correspondientes. Dada la proliferación de medios digitales en los que se publican citas de distintos grupos taxonómicos y con diferentes ámbitos geográficos, desde SABUCO se intenta recoger toda la información referen-

1 Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha

2 Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”

Correo electrónico: prontuariosabuco@iealbacetenses.com

te a la provincia que aparezca en ellos. Agradecemos que los autores de citas en otros medios nos las remitan para incluirlas en nuestro prontuario, indicando siempre la referencia en la que se hizo su publicación. Para el envío de citas es recomendable utilizar la plantilla que se puede descargar de nuestra página web, desde el apartado 2 (envío de originales) de las normas de publicación de SABUCO.

Ejemplo de cita recomendada para este prontuario:

Valdés Franzi, A., Gómez Navarro, J., Blanco Sidera, D. y Picazo Talavera, J. (rec.). Prontuario de la Naturaleza Albacetense. *Sabuco*, 18: 157-176.

Cita recomendada para observaciones concretas de este prontuario:

Escobar, J. L. (2023). *Amanita subnudipes* (Romagn.) Tulloss. En Valdés Franzi, A., Gómez Navarro, J., Blanco Sidera, D. y Picazo Talavera, J. (rec.). Prontuario de la Naturaleza Albacetense. *Sabuco*, 18: 157-176.

REINO FUNGI

División ASCOMYCOTA, Subdivisión Pezizomycotina

Clase SORDARIOMYCETES

Orden HYPOCREALES

Familia Hypocreaceae

Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul.

Se trata de un hongo parásito sobre los cuerpos fructíferos de otros hongos, principalmente afiloformales. No había sido citado anteriormente en la provincia.

Año 2024: 21 de noviembre en Cilleruelo, Masegoso (figura 1), **Carmelo Pérez**.



Figura 1. *Hypomyces rosellus*, Cilleruelo. Fotografía: Carmelo Pérez.

Clase PEZIZOMICETES

Orden PEZIZALES

Familia Helvellaceae

Helvella juniperi M. Filippa & Baiano

Escasas citas para la provincia, aunque es probable que haya sido confundida con otras especies del género de aspecto muy parecido, conocidas popularmente como orejetas.

Año 2024: 29 de marzo en Los Puntales, Villapalacios (figura 2). Herbario Alba-SMA 1494, **Leg. Sociedad Micológica de Albacete, Det. Silvino Navarro.**



Figura 2. *Helvella juniperi*, Villapalacios. Fotografía: José Luis Escobar.

Familia Pyronemataceae

Geopora clausa (Tul. & C. Tul.) Burds.

Primera cita para la provincia. El género *Geopora* son pequeños ascomicetes con forma globosa o irregular. Esta especie en particular se puede identificar por su superficie externa de color pardo y verrucosa.

Año 2024: 10 de noviembre en Campamento de Malpaso (Peñascosa), **José García.**

División BASIDIOMYCOTA, Subdivisión Agaricomycotina

Clase AGARICOMYCETES

Orden AGARICALES

Familia Amanitaceae

Amanita subnudipes (Romagn.) Tulloss

Amanita sin anillo y con cutícula de color anaranjado. No había sido citada anteriormente en la provincia.

Año 2023: 30 de junio en Casa del Corral, Casas de Lázaro (figura 3), **José Luis Escobar**.



Figura 3. *Amanita subnudipes*, Casas de Lázaro. Fotografía: José Luis Escobar.

Familia Tricholomataceae

Tricholoma acerbum (Bull. Ex Pers.) Quél.

Tricoloma robusto, con margen incurvado y cutícula seca, crema amarillenta. Especie poco frecuente en la provincia.

Año 2024: 22 de noviembre en Masegoso (figura 4). Herbario Alba-SMA 1738, **Leg. y Det. Carmelo Pérez.**



Figura 4. *Tricholoma acerbum*, Masegoso. Fotografía: Carmelo Pérez.

Familia Hydnangiaceae

Laccaria tortilis (Bolton) Cooke

Pequeña lacaria con pocas citas en la provincia.

Año 2024: 29 de marzo en Los Puntales, Villapalacios (figura 5). Herbario Alba-SMA 1511, **Leg. Sociedad Micológica de Albacete, Det. Silvino Navarro.**



Figura 5. *Laccaria tortilis*, Villapalacios. Fotografía: José Luis Escobar.

Orden RUSSULALES

Familia Russulaceae

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

Rúsula corpulenta y compacta, con cutícula de color variable con diferentes tonos de azul, verde y lila. No citada anteriormente en la provincia.

Año 2024: 16 de noviembre en campamento de San Juan, Riópar. Herbario Alba-SMA 1723, **Leg. Juan Martínez, Det. José García.**

Russula maculata Quél.

Rúsula de tamaño intermedio y color de la cutícula entre ocre y salmón, con pequeñas manchas rojizas que le dan el nombre específico. No citada anteriormente en la provincia.

Año 2024: 25 de octubre en Muela de Carcelén. Herbario Alba-SMA 1698, **Leg. José Gómez, Det. José García.**

Russula praetervisa Sarnari

Rúsula mediana de margen estriado, cutícula pardo grisácea más oscura en el centro y olor a pescado. No citada anteriormente en la provincia.

Año 2024: 7 de noviembre en pinar cercano a la laguna del Arquillo, Masegoso. Herbario Alba-SMA 1634, **Leg. y Det. José García.**

Russula galochroides Sarnari

Pequeña rúsula de cutícula mate, blanca o crema pálido. Primera cita para la provincia.

Año 2024: 24 de septiembre en pinar cercano a Villa de Ves. Herbario Alba-SMA 1607, **Leg. José Gómez, Det. José García.**

Russula persicina Krombh.

Rúsula mediana de cutícula roja y sabor picante tanto en láminas como en la carne, que tiene un olor afrutado. No había sido citada en la provincia.

Año 2024: 16 de noviembre en Balsa de Ves. Herbario Alba-SMA 1730, **Leg. José Gómez, Det. José García.**

Orden GEASTRALES

Familia Geastraceae

Geastrum minimum Schwein.

Pequeña estrella de tierra que no había sido citada anteriormente en la provincia.

Año 2024: 3 de noviembre en Balsa de Ves. Herbario Alba-SMA 1720, **Leg. y Det. José Gómez.**

REINO PLANTAE

DIVISIÓN MAGNOLIOPHYTA

Clase MAGNOLIOPSIDA

Orden ASTERALES

Familia Campanulaceae

Campanula mollis L.

(= *C. velutina* Desf.; *C. velutina* subsp. *velutina* var. *almeriensis* (Deg. & Herv.) G. López; *C. velutina* Desf. subsp. *velutina* var. *microphylla* (Cav.) G. López).

Planta mediterránea. López González (1980: 306) cita junto a Hellín (es el pliego tipo de Cavanilles *Campanula microphylla*, MA -Herbario Jardín Botánico de Madrid- nº 120849) como *Campanula velutina* Desf. subsp.

velutina var. *microphylla* (Cav.) G. López. *Flora iberica* (en adelante FI) 14: 125 muestra un icono de los Chorros del río Mundo, MA 545614, y cita solamente en 10 provincias del cuadrante SE peninsular. En ANTHOS aparece citada únicamente en zonas altas de las sierras de Alcaraz y Yeste por diversos autores.

02/06/1992. Hellín, sierra de la Umbría del Rincón, XH 0496. 980 m. Fisuras de paredes calcáreas. Herbario ALBA 4331, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

06/06/1992. Hellín, sierra del Baladre, XH 0751. 650 m. Fisuras en roquedos calcáreos. Herbario ALBA 9829, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González.**

Orden CARYOPHYLLALES

Familia Caryophyllaceae

Spergularia bocconei (Scheele) Asch. & Graebn.

(= *Alsine bocconei* Scheele)

Planta actualmente subcosmopolita. No cita FI 2: 160 en Albacete. Hay una referencia de Valdés y Molina (1997: 217), ALBA 3448, en Villa de Ves, recogida en ANTHOS y de Gómez Navarro (2011: 200) en Alborea.

06/05/1992. Isso. Praderas pastoreadas y bordes de caminos. XH 0961. 490 m. Herbario ALBA 4300, **Leg. José Luis González.**

Orden DIPSACALES

Familia Caprifoliaceae.

Sambucus ebulus L.

Planta circunmediterránea. No hay otras citas de zonas cercanas, sí varias en la provincia de Albacete (Montealegre del Castillo, Valdeganga, Alpera, Balazote, Tiriez, Povedilla, Calar del Mundo, Ruidera, etc.), algunas recogidas en ANTHOS.

17/09/1992. Tobarra, huertas en la parte baja del pueblo XH 1471. 620 m. Herbazales en bordes de acequias de riego. Herbario ALBA 4333, **Leg. José Luis González.**

Orden ASTERALES

Familia Compositae

Bidens subalternans DC.

Nativa de Sudamérica, naturalizada. Citada en Los Llanos de Albacete por Valdés *et al.* (1992: 135) donde es frecuente en sus regadíos.

23/10/2009. Hellín, a unos kilómetros en dirección a Liétor. WH 0864. 530 m. Depresión húmeda con juncos churreros. Herbario ALBA 7593, **Leg. Arturo Valdés y Rodrigo Roldán, Det. Arturo Valdés.**

Familia Asteraceae

***Carthamus creticus* L.**

(= *Carthamus lanatus* subsp. *baeticus* (Boiss. & Reut.) Nyman)

Planta de origen mediterráneo, probablemente naturalizada en la península ibérica. FI 16: 304 no cita en Albacete, sí en 10 provincias principalmente costeras. Menciona López Vélez (1996: 199, 387) de la zona del Calar del Mundo, Yeste y Elche de la Sierra.

01/06/1990. Saladar de Agramón, Hellín. XH 2258. 430 m. Taludes terrosos nitrificados. ALBA 4110, **Leg. Arturo Valdés, José Luis González y Rafael Molina.**

19/06/1992. Cancarix, Hellín. XH 2452 470 m. Suelos húmedos en márgenes de rambla y borde de campo arado. ALBA 11385, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González.**

***Cladanthus mixtus* (L.) Chevall.**

(= *Anthemis mixta* L; *Chamaemelum mixtum* (L.) All.)

Región Mediterránea y SW de Asia. FI 16: 1971 no cita en Albacete. Tampoco aparece citada en el Valdés *et al.* (2001) ni en ANTHOS. Probable primera cita provincial.

12/06/1992. Piedemonte de la sierra de las Cabras, Cancarix, Hellín. XH 2352. 480 m. Campos incultos en olivares aclarados. Herbario ALBA 11355, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

14/05/2010. Sierra del Relumbrar, Villapalacios. **Arturo Valdés y Rodrigo Roldán.**

***Filago fuscescens* Pomel**

(= *Filago pyramidata* subsp. *fuscescens* (Pomel) O. Bolòs & Vigo)

Extendida por la península ibérica y N de África. FI 16: 1704 sólo cita en Albacete y otras 4 provincias del SE peninsular. No aparece en Valdés *et al.* (2001). Citada por Andrés-Sánchez *et al.* (2013: 70) en el saladar de Agramón, testimonio recogido en ANTHOS. Sería segunda cita provincial, ambas de localidades cercanas.

06/05/1989. Bodegas, Agramón, Hellín. XH 1852. 380 m. Entre albardiñares, en terrenos más elevados y secos del saladar. Herbario ALBA 11419, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Samp.

(= *Picridium intermedium* Sch. Bip.)

Planta subcosmopolita. FI 16: 857 no cita en Albacete. Tampoco aparece en Valdés *et al.* (2001). Citada por Sánchez Gómez y Alcaraz (1993: 187), en Letur y Socovos, menciones recogidas por ANTHOS.

06/03/1990. Entre Tobarra y Hellín. XH 1367. 600 m. ALBA 13134. Herbazales viarios, con *Carduus tenuiflorus*, etc. **Leg. José Luis González, Det. José Gómez y Arturo Valdés.**

Xanthium orientale L. subsp. ***orientale***

(= *Xanthium macrocarpum* DC. in Lam. & DC.)

Planta naturalizada en casi toda la península ibérica, de origen americano. No aparece en Valdés *et al.* (2001). Gómez Navarro *et al.* (2011: 136), dan la primera cita para Albacete en Casas de Ves (recogida en FI 16: 2162, -MA 797699-, que muestra la planta iconografiada). Segunda cita provincial.

14/10/1992. Liétor, Embalse de Talave. WH 9962. 510 m. Al pie de paredes rezumantes. ALBA 11531, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Xanthium strumarium L. subsp. ***brasilicum*** (Vell.) O. Bolòs & Vigo

(= *Xanthium brasilicum* Vell.)

Planta subcosmopolita. No aparece en Valdés *et al.* (2001). Probable segunda cita provincial como subespecie.

07/09/1992. Hellín, Las Minas, Maeso, río Segura. XH 1546. 320 m. Malas hierbas en regadíos de maíz. ALBA 11533, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Xanthium strumarium L. subsp. ***strumarium***

(= *Xanthium echinatum* Murray)

Subcosmopolita. No cita FI 16: 2163 en Albacete, ni Valdés *et al.* (2001). ANTHOS no recoge subespecies de esta planta. Probable primera cita provincial como subespecie.

14/10/1989. La Asomadilla, Hellín. XH 1061. 500 m. En olivares sin arar. ALBA 11532, **Leg. José Luis González, Arturo Valdés y Rafael Molina, Det. Arturo Valdés.**

14/10/1992. Liétor, Embalse de Talave. WH 9962. 510 m. Herbazales en márgenes del embalse sobre suelos arenosos. ALBA 11534, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Orden BRASSICALES

Familia Brassicaceae

Biscutella lucentina M.B. Crespo & Mateo

Endemismo valenciano. No aparece en FI 4 por estar descrita posteriormente, tampoco en Valdés *et al.* (2001) ni en ANTHOS. Cita muy cercana a Albacete donde, de encontrarse, sería primera cita provincial.

28/02/1992. Murcia, Moratalla, sierra Cubillas, entre Casa de La Mina y El Hondón. XH 1047. 350 m. En laderas sobre conglomerados con cantos cuarcíticos. ALBA 11550, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Sisymbrium erysimoides Desf.

(= *Sisymbrium rigidulum* Lag.)

Del SW de Europa y N de África. FI 4: 24 menciona de Albacete y otras 7 provincias del E peninsular. No cita ANTHOS en la provincia. Probable segunda cita provincial.

20/03/1990. Hellín, Cancarix, sierra de las Cabras. XH 2353. 550 m. ALBA 13831, **Leg. José Luis González, Det. José Gómez y Arturo Valdés.** Praderillas bajo *Pinus halepensis*.

Orden CUCURBITALES

Familia Cucurbitaceae

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

(= *Cucumis colocynthis* L.)

Cultivada antiguamente, asilvestrada en la actualidad. FI 3: 461 no cita en Albacete, sólo en 7 provincias de España. No aparece ni en Valdés *et al.* (2001) ni en ANTHOS. Probable primera cita provincial.

07/09/1992. Hellín, Las Minas. XH 1644. 390 m. Márgenes de espartal, suelos secos pedregosos, calizos. ALBA 13127, **Leg. José Luis González, Det. José Gómez.**

Orden MALPIGHIALES

Familia Hypericaceae

Hypericum tetrapterum Fr.

(= *Hypericum quadrangulum* L., nom. rejic. prop.)

Distribución subcosmopolita. FI 3: 168 no cita en Albacete. Hay una cita en Férez (Sánchez Gómez, 1990: 514). Otros testimonios en Cuasier-

mas, Valle del Júcar de Ríos *et al.*, (2003: 125) cita recogida en ANTHOS, y en Casas de Benítez, La Losa, al S de Cuenca, cerca de Albacete (Molina *et al.*, 2008: 174).

07/07/1992. Hellín, Las Minas, Maeso. XH 1546. 320 m. Herbazales húmedos y comunidades de grandes cárices en márgenes del río Segura. ALBA 11233, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González.**

24/08/1992. Albacete, Hellín, aguas abajo del embalse del Cenajo. XH 0748. 350 m. Herbazales de *Cyperaceae* en bordes de acequia. ALBA 12355, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Orden FABALES

Familia Fabaceae

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.

(= *Hedysarum saxatile* L.)

Del SW de Europa y N de África. FI 7: 957 no cita en Albacete. Hay una referencia de Almansa en el cruce Venta de la Vega, carretera de Madrid (de la Torre y Alcaraz 1994: 133) recogida en ANTHOS y otra de Gandoger (1917: 91), en Monte Mugrón, Almansa.

25/05/1991. Hellín, Las Minas. XH 1642. 380 m. Tomillares en colinas margoso-yesíferas. ALBA 12184, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Orden MALVALES

Familia Malvaceae

Hibiscus trionum L.

Planta naturalizada subcosmopolita. FI 3: 197 no cita para Albacete. Valdés y Molina (1997: 217, ALBA 4622), y Molina *et al.*, (2008: 171) la mencionan de Alborea, citas recogidas en ANTHOS. Gómez Navarro (2011: 310), da referencias de Casas de Ves y Balsa de Ves.

07/07/1992. Hellín, Las Minas, Maeso. XH 1546. 310 m. En bordes de cultivos de regadío en las huertas del río Segura. ALBA 12619, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

20/08/1992. Hellín, entre Acequia de Tavizna y río Mundo, Casa Nueva. XH 1054. 400 m. Malas hierbas en cultivos de regadío de maizales estivales. ALBA 12620, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Orden LAMIALES

Familia Orobanchaceae

Orobanche gracilis Sm.

(= *Orobanche cruenta* Bertol.; *Orobanche ulicis* Des Moul.; *Orobanche variegata* auct. hisp., non Wallr.)

Del C, S y E de Europa. FI 14: 66 considera planta dispersa por la península ibérica. Como *Orobanche variegata*, Willkomm (1893: 186) recoge una cita de Rouy, pr. Hellín, sierra de las Cabras. Cuatrecasas (1926: 39) la menciona de La Molata. Gómez Navarro (2011: 316), como subsp. *gracilis*, la cita en Casas de Ves y López Vélez (1996: 184) de las sierras del Calar del Mundo, referencia recogida en ANTHOS.

09/01/1990. Hellín, La Vicaría. XH 0261. 500 m. En talud arenoso del margen de la carretera. ALBA 4323, **Leg. Arturo Valdés, José Luis González y Rafael Molina, Det. José Gómez.**

Orden CARYOPHYLLALES

Familia Polygonaceae

Rumex intermedius DC. in Lam. & DC.

(= *Rumex thirsoides* auct., non Desf.)

Del W mediterráneo y N de África. Hay diversas citas en la provincia de Albacete: Villa de Ves, Balsa de Ves, Villapalacios, Nerpio, Macizo del Calar del Mundo, etc., esta última recogida en ANTHOS.

02/06/1992. Hellín, sierra de la Umbría del Rincón. XH 0469. 880 m. Sobre suelos terrosos nitrificados entre rocas calizas en laderas. ALBA 12569, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Orden GENTIANALES

Familia Rubiaceae

Galium verrucosum Huds. subsp. ***verrucosum***

(= *Galium valantia* Weber)

Del S de Europa y Asia, N de África. FI 15: 151 no cita en Albacete. Tampoco se menciona en Valdés *et al.* (2001) ni en ANTHOS. Referencias de Gómez Navarro *et al.* (2013: 82) en Casas de Ves. Segunda cita provincial.

06/05/1992. Hellín, Nava-Campana, cercanías. XH 1761. 480 m. Herbazales frescos viarios en taludes removidos y nitrificados. ALBA 12723, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

02/05/1992. Hellín, alrededores del pueblo. XH 1365. 570 m. Herbazales en márgenes de un camino. ALBA 12724, **Leg. Arturo Valdés y José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Orden SCROPHULARIALES

Familia Scrophulariaceae

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. ***elatine***

(= *Antirrhinum elatine* L.)

De Europa, SW de Asia y N África. Para FI 13: 218 es más frecuente en el N peninsular. Poco señalada en la provincia. Existe una referencia de Las Fuentes de Alpera de Figuerola *et al.* (1989: 296) recogida en ANTHOS y de Gómez Navarro (2011: 355) en Cilanco, cerca de Villatoya.

07/09/1992. Hellín, río Mundo, embalse de Camarillas. XH 1949. 350 m. Herbazales húmedos en sus márgenes. ALBA 12800, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

24/09/1992. Hellín, río Segura, aguas abajo del embalse del Cenajo. XH 0747. 350 m. Malas hierbas en choperas y cultivos de frutales. ALBA 12801, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

Scrophularia crithmifolia Boiss.

(= *Scrophularia canina* subsp. *crithmifolia* (Boiss.) O. Bolòs & Vigo; *S. hoppei* auct., non W.D.J. Koch in Röhl.)

Endemismo del S, E y NE España. FI 13: 132 no cita de Ab. Tampoco se menciona ni en Valdés *et al.* (2001) ni en ANTHOS. Hay una cita genérica de Ríos *et al.* (1996: 215) del tramo medio del Segura. Probable primera cita provincial expresa.

06/04/1992. Tobarra, cerca del Pueblo, junto carretera nacional 301, km 294. XH 1474. 670 m. Taludes frescos en los márgenes de la carretera. ALBA 12822, **Leg. José Luis González, Det. Arturo Valdés.**

REINO ANIMALIA

FILO MOLUSCA

Clase GASTROPODA

Orden STYLOMMATOPHORA

Familia Helicidae

Iberus gualtieranus ssp. gualtieranus

Este caracol terrestre, de concha aplanada, se considera endémico de Almería, aunque parece haber poblaciones introducidas en Granada, Jaén y Valencia. Es muy escasa y en regresión. “En peligro de extinción” en el *Libro rojo de los invertebrados de Andalucía*.

2024. Sierra del Pino, Hellín. Un ejemplar el 22 de octubre (figura 6), **Alejandro García** en <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.



Figura 6. *Iberus gualtieranus ssp. gualtieranus*, Hellín. Fotografía: Alejandro García.

FILO CHORDATA

Clase SAUROPSIDA

Oren SQUAMATA

Familia Blanidae

Culebrilla ciega *Blanus cinereus* Vandelli, 1797

Por sus hábitos subterráneos es una especie que pasa desapercibida, aunque se piensa que su distribución debe ser amplia. Dado el poco conocimiento de la especie en la provincia hemos recopilado las citas aparecidas en <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

Año 2020. Un ejemplar en Cerrolobo, Albacete el 15 de julio, **Francisco Javier Cullell Tórtola**. Un ejemplar en Jorquera el 20 de julio, **Pablo López Aracil**.

31/05/2022. Un ejemplar encontrado en un portal, Tobarra, **Ana Mina**.

10/06/2023. Ejemplar en Alcalá del Júcar, **Pedro Munera Motilla**.

03/03/2024. Un ejemplar en Valdeganga, **Eoweem**.

Familia Scincidae

Eslizón ibérico *Chalcides bedriagai* Boscá, 1980

Los eslizones son lagartos con patas reducidas que suelen pasar desapercibidos, por lo que hemos recogido aquí las citas publicadas en <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>



Figura 7. *Chalcides bedriagai*, Casas de Ves. Fotografía: Laura Sánchez.

24/06/2016. Un ejemplar en la ribera del Júcar, Valdeganga, **Rafiki Mondison**.

Agosto de 2016. Individuo encontrado muerto. Paterna del Madera, **José Luis López González**.

03/06/2020. Un ejemplar en Casas de Ves (figura 7), **Laura Sánchez**.

Año 2023. Marzo, un ejemplar en Villarrobledo, **Jesús Segovia Molina**. 29 de mayo, un ejemplar en Alpera, **Guillermo Navarro González**. 22 de agosto, un individuo en Casas Ibáñez, **Lolo Rp**.

Eslizón tridáctilo *Chalcides striatus* Cuvier, 1829

Citas publicadas en <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>

12/04/2022. Tres ejemplares observados en un campo recién arado en El Horcajo, Alcaraz, **Ira Hnizdovsca**.

03/11/2024. Ejemplar en Alcalá del Júcar, **Pedro Munera Motilla**.

BIBLIOGRAFÍA

Alcaraz F. y Valdés, A. (2003). *Vegetación de sotos y riberas de la provincia de Albacete (España)*. IEA. Serie I. Estudios nº 148.

Andrés-Sánchez, S., Martínez-Ortega, M. M. y Rico, E. (2013). Estudio corológico del género *Filago* L. (*Asteraceae*, *Gnaphalieae*) en la Península Ibérica y Baleares. *Botanica complutensis*, 37: 57-78.

ANTHOS (2024). Sistema de información sobre las plantas de España. Ministerio de Medio Ambiente. Fundación Biodiversidad. Real Jardín Botánico, CSIC. <http://www.anthos.es>, último acceso 3/12/2024.

Cuatrecasas, J. 1926. Excursión botánica a Alcaraz y Riópar. *Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona* 5, Ser. Bot., 7: 1-49.

De la Torre, A. y Alcaraz, F. (1994). Novedades sintaxonómicas en el orden *Rosmarinetalia officinalis* Br. -Br. 1931 em. 1952 para el sureste de España. *Lazaroa*, 14: 125-138.

Figuerola, R., Peris, J. B. y Estesó, F. (1989). Notes floristiques y corològiques 231-266. *Collect. Bot.*, 17(2): 295-297.

Gandoger, M. (1917) *Catalogue des plantes récoltées en Espagne et en Portugal pendant mes voyages de 1894 à 1912*. Freres, Macon Protrat. Paris.

Gómez Navarro, J. (2011). *Aportaciones al Estudio de la Flora y Vegetación del Extremo NE de la Provincia de Albacete y zonas adyacentes de la Provincia de Valencia (España)*. IEA. Serie I. Estudios nº 199. Albacete.

Gómez Navarro, J., Peris Gisbert, J. B., Valdés Franzí, A., Sanchis Duato, E. y Roselló Gimeno, R. (2011). Plantas de interés del NE de la provincia de Albacete e inmediaciones de la provincia de Valencia, VI. *Sabuco*, 8: 117-142.

Gómez Navarro, J., Ferrer Gallego, P. P., Roselló Gimeno, R., Peris Gisbert, J. B., Valdés Franzí, A. y Sanchis Duato, E. (2013). Plantas de interés

- del NE de la provincia de Albacete e inmediaciones de la provincia de Valencia, VII. *Sabuco*, 9: 69-93.
- López González, G. (1980). Dos campánulas españolas: *C. decumbens* DC. y *C. mollis* L. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, 53: 299-308
- López Vélez G. (1996). *Flora y vegetación del macizo del Calar del Mundo y sierras adyacentes del sur de Albacete*. IEA, Serie 1, N.º 85.
- Molina, R., Valdés, A. y Alcaraz, F. J. (2008). *Flora y vegetación del tramo medio del valle del río Júcar (Albacete)*. IEA, Serie I, N.º 184.
- Molina, R., Valdés, A. y Alcaraz, F. (2008) *Flora y vegetación del tramo medio del Valle del Júcar (Albacete)*. IEA Serie I. Estudios nº 184.
- Ríos, S. Alcaraz, F. y Valdés, A. (2003). *Vegetación de sotos y riberas de la provincia de Albacete*. IEA, Serie I, N.º 148.
- Ríos, S., Alcaraz, F. y Cano, F. (col.) (1996) *Flora de las riberas y zonas húmedas de la cuenca del Río Segura*. Serv. Publ. Univ. Murcia.
- Sánchez Gómez, P. y Alcaraz, F. (1993). *Flora, vegetación y paisaje vegetal de las Sierras de Segura Orientales*. IEA, Ser. 1, N.º 69. Albacete.
- Sánchez Gómez, P. (1990). *Estudio de la flora, vegetación y paisaje vegetal de las sierras de Segura orientales (Albacete, Murcia)*. Tesis doct. inéd. Fac. de Biología, Univ. De Murcia. 730 pp.
- Valdés A., Alcaraz F. y Rivera, D. (2001) *Catálogo de plantas vasculares de la provincia de Albacete (España)*. IEA Serie I. Estudios nº 127. Albacete.
- Valdés, A. y Molina, R. (1997). Referencias corológicas de plantas vasculares para el SE ibérico. *Acta Bot. Malacitana*, 22: 215-218.
- Valdés, A., Molina, R. y González, J. L. (1992). Aportación al conocimiento de la flora de Albacete. *Stvdia Botanica*, 10: 135-137.
- VV. AA. (1986-2021). *Flora iberica*. Real Jardín Botánico, CSIC, 20 vols.
- Willkomm, H. M. (1893). *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*. E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.

